

はじめに (数学基礎 B1)

数学基礎 B = 線形代数

教科書 「要点明解 線形数学」 培風館

- ▶ 第1章 行列
- ▶ 第2章 連立1次方程式
(第3章 行列式)
(第4章 行列の対角化)

講義の情報

<http://mathweb.sc.niigata-u.ac.jp/~hoshi/teaching-j.html>

シラバス

LINK

- ▶ ノートを取りながら講義を聴くこと。
(ノートを回収して確認する可能性があります)
- ▶ 講義 → 小テスト (理解度確認テスト, 学務情報システム内)

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明)

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき,

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換,

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に,

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる. この操作を $(1, n_1)$ 成分を中心として第 n_1 列を 掃き出す という.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる. この操作を $(1, n_1)$ 成分を中心として第 n_1 列を 掃き出す という. これを繰り返していけば, **ガウス行列** をえる. □

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って **ガウス行列** にできる.

(証明) $A = \mathbf{O}$ (零行列) は **ガウス行列**. $A \neq \mathbf{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる. この操作を $(1, n_1)$ 成分を中心として第 n_1 列を 掃き出す という. これを繰り返していけば, **ガウス行列** をえる. □

- ▶ このようにして **ガウス行列** を求める方法を 掃き出し法 という.

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3)$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \rightarrow \end{array} \boxed{\text{III}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \\ \downarrow \times(-5) \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \rightarrow \end{array} \boxed{\text{III}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \rightarrow \end{array} \boxed{\text{III}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

III
→

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \\ \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \\ \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \\ \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \\ \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \times \frac{1}{8} \\ \text{II} \\ \rightarrow \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \text{II} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \\ \\ \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-2) \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \times \frac{1}{8} \\ \text{II} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-5) \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \times \frac{1}{8} \\ \text{II} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \times \frac{1}{8} \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \uparrow \times 1 \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \uparrow \times 1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \text{ を掃き出し法でガウス行列にする.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \downarrow \times(-3) \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \downarrow \times(-5) \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-2) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \times \frac{1}{8} \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{II}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \uparrow \times 1 \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \downarrow \times(-8) \\ \end{array} \begin{array}{l} \boxed{\text{III}} \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \end{pmatrix} \dots \text{ガウス行列}$$

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して **ガウス行列** にしたときの **初 1** の数 (階段の数) を A の 階数 (rank) といい, $\text{rank}(A)$ とあらわす.

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して **ガウス行列**にしたときの**初 1** の数 (階段の数) を A の **階数** (rank) といい, $\text{rank}(A)$ とあらわす.

例

上の例より,

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して **ガウス行列**にしたときの**初 1** の数 (階段の数) を A の **階数** (rank) といい, $\text{rank}(A)$ とあらわす.

例

上の例より,

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \right) = \text{rank} \left(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \right) = 2.$$

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して **ガウス行列** にしたときの **初 1** の数 (階段の数) を A の **階数** (rank) といい、 $\text{rank}(A)$ とあらわす。

例

上の例より,

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \right) = \text{rank} \left(\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 2.$$

また, 以前の例より

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right) = \text{rank} \left(\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 \end{pmatrix} \right) = 2.$$

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して **ガウス行列**にしたときの**初 1** の数 (階段の数) を A の **階数** (rank) といい、 $\text{rank}(A)$ とあらわす。

例

上の例より,

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \right) = \text{rank} \left(\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 2.$$

また, 以前の例より

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right) = \text{rank} \left(\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 \end{pmatrix} \right) = 2.$$

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{pmatrix} \right) = \text{rank} \left(\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 \end{pmatrix} \right) = 3.$$

注意

行列 A の階数 $\text{rank}(A)$ は行基本変形では変化しない.

注意

行列 A の階数 $\text{rank}(A)$ は行基本変形では変化しない.

注意

$A : m \times n$ 行列 $\Rightarrow \text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$.

但し, $\min\{m, n\}$ は m と n の最小値 (minimum) をあらわす.

2.3 連立1次方程式

より一般には,

2.3 連立1次方程式

より一般には,

$$\text{連立1次方程式} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる.

2.3 連立1次方程式

より一般には,

$$\text{連立1次方程式} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる. (1) は, 行列をもちいて

2.3 連立1次方程式

より一般には,

$$\text{連立1次方程式} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる. (1)は, 行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{に対して,}$$

2.3 連立1次方程式

より一般には,

$$\text{連立1次方程式} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる. (1)は, 行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{に対して,}$$

$$\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{b}}$$

と表せる.

2.3 連立1次方程式

より一般には,

$$\text{連立1次方程式} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる. (1) は, 行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{に対して,}$$

$$\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{b}}$$

と表せる. 行列 A を連立1次方程式 (1) の 係数行列,

2.3 連立1次方程式

より一般には,

$$\text{連立1次方程式} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる. (1)は, 行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{に対して,}$$

$$\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{b}}$$

と表せる. 行列 A を連立1次方程式 (1) の 係数行列, A の最後の列に \mathbf{b} を付け加えた $m \times (n+1)$ 行列 $\overline{A} = (A | \mathbf{b})$ を 拡大係数行列 という.