はじめに　(線形代数 IIA)

線形代数 II　＝　線形代数 I のつづき

教科書　「やさしい線形代数，H．アントン著，山下純一訳」現代数学社

講義の情報　http://mathweb.sc.niigata-u.ac.jp/~hoshi/teaching-j.html

シラバス　LINK

- ノートを取りながら講義を聴くこと．
  (ノートを回収して確認する可能性があります)
- 講義 $\longrightarrow$ 小テスト (理解度確認テスト，学務情報システム内)

第 5 章　~~1 次変換~~　→　線形写像

5.1　~~1 次変換~~　→　線形写像

5.1　~~1 次変換~~　→　線形写像

定義 (線形写像，1 次変換)

V, W：線形空間．写像 $F : V \to W$ が~~1 次変換~~ 線形写像とは，
(i) $F(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = F(\mathbb{u}) + F(\mathbb{v})$ $(\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V)$;
(ii) $F(k\,\mathbb{u}) = k\,F(\mathbb{u})$ $(\forall k \in \mathbb{R}, \forall \mathbb{u} \in V)$
をみたすこと．$V = W$ のとき，F を V 上の1 次変換という．

5.1　~~1 次変換~~　→　線形写像

定義 (線形写像，1 次変換)

V, W：線形空間．写像 $F : V \to W$ が~~1 次変換~~ 線形写像とは，
(i) $F(\mathrm{u}+\mathrm{v}) = F(\mathrm{u}) + F(\mathrm{v})$ $(\forall \mathrm{u}, \mathrm{v} \in V)$;
(ii) $F(k\,\mathrm{u}) = k\,F(\mathrm{u})$ $(\forall k \in \mathbb{R}, \forall \mathrm{u} \in V)$
をみたすこと．$V = W$ のとき，F を V 上の1 次変換という．

注意

(i) かつ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $F(k\,\mathrm{u}+l\,\mathrm{v}) = k\,F(\mathrm{u}) + l\,F(\mathrm{v})$ $(\forall k, l \in \mathbb{R}, \forall \mathrm{u}, \mathrm{v} \in V)$.

5.1　~~1 次変換~~　→　線形写像

定義 (線形写像，1 次変換)

V, W：線形空間．写像 $F : V \to W$ が~~1 次変換~~ 線形写像とは，
(i) $F(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = F(\mathbb{u}) + F(\mathbb{v})$ $(\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V)$;
(ii) $F(k\,\mathbb{u}) = k\,F(\mathbb{u})$ $(\forall k \in \mathbb{R}, \forall \mathbb{u} \in V)$
をみたすこと．$V = W$ のとき，F を V 上の1 次変換という．

注意

(i) かつ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $F(k\,\mathbb{u} + l\,\mathbb{v}) = k\,F(\mathbb{u}) + l\,F(\mathbb{v})$ $(\forall k, l \in \mathbb{R}, \forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V)$.
$\because$ $(\Rightarrow)$ OK.

5.1　~~1 次変換~~　→　線形写像

定義 (線形写像，1 次変換)

V, W：線形空間．写像 $F : V \to W$ が~~1 次変換~~ 線形写像とは，
(i) $F(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = F(\mathbb{u}) + F(\mathbb{v})$ $(\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V)$;
(ii) $F(k\,\mathbb{u}) = k\,F(\mathbb{u})$ $(\forall k \in \mathbb{R}, \forall \mathbb{u} \in V)$
をみたすこと．$V = W$ のとき，F を V 上の1 次変換という．

注意

(i) かつ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $F(k\,\mathbb{u} + l\,\mathbb{v}) = k\,F(\mathbb{u}) + l\,F(\mathbb{v})$ $(\forall k, l \in \mathbb{R}, \forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V)$.
$\because$ $(\Rightarrow)$ OK. $(\Leftarrow)$ $k = l = 1$ と $l = 0$ で OK.

例

A：$m \times n$ 行列.
$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ は線形写像.

例

A：$m \times n$ 行列.
$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ は線形写像.
$\because A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$ より $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$,

例

A：$m \times n$ 行列.
$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ は線形写像.
$\because A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$ より $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$,
$A(k\,\mathbf{u}) = k\,(A\mathbf{u})$ より $T(k\,\mathbf{u}) = k\,T(\mathbf{u})$.

例

A：$m \times n$ 行列.
$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ は線形写像.
$\because A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$ より $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$,
$A(k\,\mathbf{u}) = k\,(A\mathbf{u})$ より $T(k\,\mathbf{u}) = k\,T(\mathbf{u})$.
例えば, $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ x-y \end{pmatrix}$ は線形写像.

例

A：$m \times n$ 行列.
$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ は線形写像.
$\because A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$ より $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$,
$A(k\,\mathbf{u}) = k\,(A\mathbf{u})$ より $T(k\,\mathbf{u}) = k\,T(\mathbf{u})$.
例えば, $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ x-y \end{pmatrix}$ は線形写像.

注意

$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ は線形写像ではない.

例

A：$m \times n$ 行列.
$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ は線形写像.
$\because A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$ より $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$,
$A(k\,\mathbf{u}) = k\,(A\mathbf{u})$ より $T(k\,\mathbf{u}) = k\,T(\mathbf{u})$.
例えば, $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ x-y \end{pmatrix}$ は線形写像.

注意

$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ は線形写像ではない.
$\because F(2x) = (2x)^2 = 4x^2 = 2^2 F(x) \neq 2F(x)$. “線形” = “linear” = “1 次”

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

この 1 次変換をθ ラジアン回転という.

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

この 1 次変換をθ ラジアン回転という.

実際, $\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{pmatrix}$ と極座標表示すると,

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

この 1 次変換をθ ラジアン回転という.

実際, $\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{pmatrix}$ と極座標表示すると, $\mathbb{v}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} =$

$A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta \\ r\cos\phi\sin\theta + r\sin\phi\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\phi+\theta) \\ r\sin(\phi+\theta) \end{pmatrix}$.

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

この 1 次変換をθ ラジアン回転という.

実際, $\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{pmatrix}$ と極座標表示すると, $\mathbb{v}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} =$

$A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta \\ r\cos\phi\sin\theta + r\sin\phi\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\phi+\theta) \\ r\sin(\phi+\theta) \end{pmatrix}$.

例

V, W : 線形空間. $T : V \to W$, $\mathbb{v} \mapsto \mathfrak{o}$ は線形写像.

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

この 1 次変換をθ ラジアン回転という.

実際, $\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{pmatrix}$ と極座標表示すると, $\mathbb{v}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} =$

$A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta \\ r\cos\phi\sin\theta + r\sin\phi\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\phi+\theta) \\ r\sin(\phi+\theta) \end{pmatrix}$.

例

V, W : 線形空間. $T : V \to W$, $\mathbb{v} \mapsto \mathbb{o}$ は線形写像. (**ゼロ写像**という)

例

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. $T = T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$ は線形写像.

この 1 次変換をθ ラジアン回転という.

実際, $\mathbb{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{pmatrix}$ と極座標表示すると, $\mathbb{v}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} =$

$A\mathbb{v} = \begin{pmatrix} r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta \\ r\cos\phi\sin\theta + r\sin\phi\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\phi+\theta) \\ r\sin(\phi+\theta) \end{pmatrix}$.

例

V, W : 線形空間. $T : V \to W$, $\mathbb{v} \mapsto \mathbb{o}$ は線形写像. (**ゼロ写像**という)

$\because T(\mathbb{u}+\mathbb{v}) = \mathbb{o} = \mathbb{o}+\mathbb{o} = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,

$T(k\,\mathbb{u}) = \mathbb{o} = k\cdot\mathbb{o} = k\cdot T(\mathbb{u})$ $(\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V, k \in \mathbb{R})$.

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 $(k > 1)$, 比例縮小 $(0 < k < 1)$ という)

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 $(k > 1)$, 比例縮小 $(0 < k < 1)$ という)
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k\,\mathbb{u} + k\,\mathbb{v} = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v}),$
$T(l\,\mathbb{u}) = k(l\,\mathbb{u}) = l(k\,\mathbb{u}) = l \cdot T(\mathbb{u})\ (\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V, l \in \mathbb{R}).$

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 $(k > 1)$, 比例縮小 $(0 < k < 1)$ という)
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k\,\mathbb{u} + k\,\mathbb{v} = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,
$T(l\,\mathbb{u}) = k(l\,\mathbb{u}) = l(k\,\mathbb{u}) = l \cdot T(\mathbb{u})\ (\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V, l \in \mathbb{R})$.

例

V：内積空間，$W \subset V$, $S = \{\mathbb{w}_1, \ldots, \mathbb{w}_r\}$：$W$ の正規直交基底.

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 $(k > 1)$, 比例縮小 $(0 < k < 1)$ という)
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k\,\mathbb{u} + k\,\mathbb{v} = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,
$T(l\,\mathbb{u}) = k(l\,\mathbb{u}) = l(k\,\mathbb{u}) = l \cdot T(\mathbb{u})\ (\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V, l \in \mathbb{R})$.

例

V : 内積空間, $W \subset V$, $S = \{\mathbb{w}_1, \ldots, \mathbb{w}_r\}$: W の正規直交基底.
$T : V \to W,\ \mathbb{v} \mapsto \mathrm{proj}_W\, \mathbb{v} = \langle \mathbb{v}, \mathbb{w}_1 \rangle \mathbb{w}_1 + \cdots + \langle \mathbb{v}, \mathbb{w}_r \rangle \mathbb{w}_r$
: $\mathbb{v}$ の W への正射影は線形写像.

例

$T : V \to V,\ \mathbf{v} \mapsto k \cdot \mathbf{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 $(k > 1)$, 比例縮小 $(0 < k < 1)$ という)
$\because T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\,\mathbf{u} + k\,\mathbf{v} = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}),$
$T(l\,\mathbf{u}) = k(l\,\mathbf{u}) = l(k\,\mathbf{u}) = l \cdot T(\mathbf{u})\ (\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, l \in \mathbb{R}).$

例

V : 内積空間, $W \subset V$, $S = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_r\}$: W の正規直交基底.
$T : V \to W,\ \mathbf{v} \mapsto \mathrm{proj}_W \mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \cdots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_r \rangle \mathbf{w}_r$
: $\mathbf{v}$ の W への正射影は線形写像.
$\because$ 各自. (教 p.254)

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 ($k > 1$), 比例縮小 ($0 < k < 1$) という)
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k\,\mathbb{u} + k\,\mathbb{v} = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v}),$
$T(l\,\mathbb{u}) = k(l\,\mathbb{u}) = l(k\,\mathbb{u}) = l \cdot T(\mathbb{u})\ (\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V, l \in \mathbb{R}).$

例

V : 内積空間, $W \subset V$, $S = \{\mathbb{w}_1, \ldots, \mathbb{w}_r\}$: W の正規直交基底.
$T : V \to W,\ \mathbb{v} \mapsto \mathrm{proj}_W\, \mathbb{v} = \langle \mathbb{v}, \mathbb{w}_1 \rangle \mathbb{w}_1 + \cdots + \langle \mathbb{v}, \mathbb{w}_r \rangle \mathbb{w}_r$
: $\mathbb{v}$ の W への正射影は線形写像.
$\because$ 各自. (教 p.254)

例

V : 線形空間, S : V の基底, $(\mathbb{v})_S$: S に関する $\mathbb{v}$ の座標ベクトル.
$T : V \to \mathbb{R}^n,\ \mathbb{v} \mapsto (\mathbb{v})_S$ は線形写像.

例

$T : V \to V,\ \mathbf{v} \mapsto k \cdot \mathbf{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 $(k > 1)$, 比例縮小 $(0 < k < 1)$ という)
$\because T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\,\mathbf{u} + k\,\mathbf{v} = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$,
$T(l\,\mathbf{u}) = k(l\,\mathbf{u}) = l(k\,\mathbf{u}) = l \cdot T(\mathbf{u})\ (\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, l \in \mathbb{R})$.

例

V : 内積空間, $W \subset V$, $S = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_r\}$: W の正規直交基底.
$T : V \to W,\ \mathbf{v} \mapsto \mathrm{proj}_W \mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \cdots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_r \rangle \mathbf{w}_r$
: $\mathbf{v}$ の W への正射影は線形写像.
$\because$ 各自. (教 p.254)

例

V : 線形空間, S : V の基底, $(\mathbf{v})_S$: S に関する $\mathbf{v}$ の座標ベクトル.
$T : V \to \mathbb{R}^n,\ \mathbf{v} \mapsto (\mathbf{v})_S$ は線形写像.
$\because$ 各自. (教 p.255)

例

$T : V \to V,\ \mathbb{v} \mapsto k \cdot \mathbb{v}$ は 1 次変換 (線形写像).
(比例拡大 ($k > 1$), 比例縮小 ($0 < k < 1$) という)
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = k\,\mathbb{u} + k\,\mathbb{v} = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v}),$
$T(l\,\mathbb{u}) = k(l\,\mathbb{u}) = l(k\,\mathbb{u}) = l \cdot T(\mathbb{u})\ (\forall \mathbb{u}, \mathbb{v} \in V, l \in \mathbb{R}).$

例

V : 内積空間, $W \subset V$, $S = \{\mathbb{w}_1, \ldots, \mathbb{w}_r\}$: W の正規直交基底.
$T : V \to W,\ \mathbb{v} \mapsto \mathrm{proj}_W \mathbb{v} = \langle \mathbb{v}, \mathbb{w}_1 \rangle \mathbb{w}_1 + \cdots + \langle \mathbb{v}, \mathbb{w}_r \rangle \mathbb{w}_r$
: $\mathbb{v}$ の W への正射影は線形写像.
$\because$ 各自. (教 p.254)

例

V : 線形空間, S : V の基底, $(\mathbb{v})_S$: S に関する $\mathbb{v}$ の座標ベクトル.
$T : V \to \mathbb{R}^n,\ \mathbb{v} \mapsto (\mathbb{v})_S$ は線形写像.
$\because$ 各自. (教 p.255)

- 座標ベクトル $(\mathbb{v})_S$ のかわりに座標行列 $[\mathbb{v}]_S$ としても同様

例

V：内積空間，$\mathbf{v}_0 \in V$. $T : V \to \mathbb{R}$, $\mathbf{v} \mapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle$ は線形写像.

例

V：内積空間，$\mathrm{v}_0 \in V$. $T : V \to \mathbb{R}$, $\mathrm{v} \mapsto \langle \mathrm{v}, \mathrm{v}_0 \rangle$ は線形写像.
$\because T(\mathrm{u}+\mathrm{v}) = \langle \mathrm{u}+\mathrm{v}, \mathrm{v}_0 \rangle = \langle \mathrm{u}, \mathrm{v}_0 \rangle + \langle \mathrm{v}, \mathrm{v}_0 \rangle = T(\mathrm{u}) + T(\mathrm{v})$,
$T(k\,\mathrm{u}) = \langle k\,\mathrm{u}, \mathrm{v}_0 \rangle = k \langle \mathrm{u}, \mathrm{v}_0 \rangle = k\,T(\mathrm{u})$.

例

V：内積空間，$\mathbb{v}_0 \in V$. $T : V \to \mathbb{R}$, $\mathbb{v} \mapsto \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle$ は線形写像.
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = \langle \mathbb{u} + \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle + \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,
$T(k\,\mathbb{u}) = \langle k\,\mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k\,T(\mathbb{u})$.

例

$V := C[0,1] = \{ f : [0,1] \to \mathbb{R} \text{：連続} \}$,
$D : V \to V$, $f \mapsto f'$ (微分) は線形写像.

例

V：内積空間，$\mathbb{v}_0 \in V$. $T : V \to \mathbb{R}$, $\mathbb{v} \mapsto \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle$ は線形写像.
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = \langle \mathbb{u} + \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle + \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,
$T(k\,\mathbb{u}) = \langle k\,\mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k\,\langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k\,T(\mathbb{u})$.

例

$V := C[0,1] = \{ f : [0,1] \to \mathbb{R} \text{：連続} \}$,
$D : V \to V$, $f \mapsto f'$ (微分) は線形写像.
$\because D(f+g) = D(f) + D(g)$, $D(k\,f) = k\,D(f)$ $(\forall f, g \in V)$.

例

V：内積空間，$\mathbb{v}_0 \in V$. $T : V \to \mathbb{R}$, $\mathbb{v} \mapsto \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle$ は線形写像.
$\because T(\mathbb{u} + \mathbb{v}) = \langle \mathbb{u} + \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle + \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,
$T(k\,\mathbb{u}) = \langle k\,\mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k\,T(\mathbb{u})$.

例

$V := C[0,1] = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} :$ 連続 $\}$,
$D : V \to V$, $f \mapsto f'$ (微分) は線形写像.
$\because D(f+g) = D(f) + D(g)$, $D(k\,f) = k\,D(f)$ $(\forall f, g \in V)$.

例

$V := C[0,1] = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} :$ 連続 $\}$,
$J : V \to \mathbb{R}$, $f \mapsto \int_0^1 f(x)dx$ は線形写像.

例

V：内積空間，$\mathbb{v}_0 \in V$. $T : V \to \mathbb{R}$, $\mathbb{v} \mapsto \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle$ は線形写像.
$\because T(\mathbb{u}+\mathbb{v}) = \langle \mathbb{u}+\mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle + \langle \mathbb{v}, \mathbb{v}_0 \rangle = T(\mathbb{u}) + T(\mathbb{v})$,
$T(k\,\mathbb{u}) = \langle k\,\mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k \langle \mathbb{u}, \mathbb{v}_0 \rangle = k\,T(\mathbb{u})$.

例

$V := C[0,1] = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} : \text{連続}\}$,
$D : V \to V$, $f \mapsto f'$ (微分) は線形写像.
$\because D(f+g) = D(f) + D(g)$, $D(k\,f) = k\,D(f)$ $(\forall f, g \in V)$.

例

$V := C[0,1] = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} : \text{連続}\}$,
$J : V \to \mathbb{R}$, $f \mapsto \int_0^1 f(x)dx$ は線形写像.
$\because J(f+g) = \int_0^1 (f(x)+g(x))dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx = J(f) + J(g)$,
$J(k\,f) = \int_0^1 kf(x) = k \int_0^1 f(x)dx = k\,J(f)$ $(\forall f, g \in V)$.

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

定理 1

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$;
(b) $T(-\mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{v} \in V)$;
(c) $T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{u}, \mathfrak{v} \in V)$.

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

定理 1

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$;
(b) $T(-\mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{v} \in V)$;
(c) $T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{u}, \mathfrak{v} \in V)$.

(証明)

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

定理 1

$T : V \to W$：線形写像.
$(a)\ T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$;
$(b)\ T(-\mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})\ (\forall \mathfrak{v} \in V)$;
$(c)\ T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})\ (\forall \mathfrak{u}, \mathfrak{v} \in V)$.

(証明) $(a)\ T(\mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o} + \mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o}) + T(\mathfrak{o})$.

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

定理 1

$T : V \to W$：線形写像.
$(a)\ T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$;
$(b)\ T(-\mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})\ (\forall \mathfrak{v} \in V)$;
$(c)\ T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})\ (\forall \mathfrak{u}, \mathfrak{v} \in V)$.

(証明) $(a)\ T(\mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o} + \mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o}) + T(\mathfrak{o})$.　$\therefore T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$.

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

定理 1

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$;
(b) $T(-\mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{v} \in V)$;
(c) $T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{u}, \mathfrak{v} \in V)$.

(証明) (a) $T(\mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o} + \mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o}) + T(\mathfrak{o})$.　$\therefore T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$.
(b) $T(-\mathfrak{v}) = T((-1) \cdot \mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})$.

5.2　~~1次変換~~の性質　→　線形写像の性質；核と像

定理 1

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$;
(b) $T(-\mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{v} \in V)$;
(c) $T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})$ $(\forall \mathfrak{u}, \mathfrak{v} \in V)$.

(証明) (a) $T(\mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o} + \mathfrak{o}) = T(\mathfrak{o}) + T(\mathfrak{o})$.　$\therefore T(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$.
(b) $T(-\mathfrak{v}) = T((-1) \cdot \mathfrak{v}) = -T(\mathfrak{v})$.
(c) $T(\mathfrak{u} - \mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u} + (-1)\mathfrak{v}) = T(\mathfrak{u}) + T(-\mathfrak{v}) \underset{(b)}{=} T(\mathfrak{u}) - T(\mathfrak{v})$. □

定義 (核，像)

$T : V \to W$：線形写像.

$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$：$T$ の核；　(核 ··· kernel)

$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$：$T$ の像.　(像 ··· image)

定義 (核，像)

$T : V \to W$：線形写像.

$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$：$T$ の核；　(核 ··· kernel)

$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$：$T$ の像.　(像 ··· image)



定義 (核, 像)

$T : V \to W$: 線形写像.

$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$: T の核 ; (核 ··· kernel)

$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$: T の像. (像 ··· image)



例

$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbb{x} \mapsto A\mathbb{x}$ (A は $m \times n$ 行列).

定義 (核，像)

$T : V \to W$：線形写像.
$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$：$T$ の核；　(核 ··· kernel)
$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$：$T$ の像.　(像 ··· image)



例

$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbb{x} \mapsto A\mathbb{x}$ (A は $m \times n$ 行列).
$\mathrm{Ker}(T_A) = \{\mathbb{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbb{x} = \mathbb{o}\}$：連立方程式の解空間；

定義 (核，像)

$T : V \to W$：線形写像.
$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$：$T$ の核；　(核 ··· kernel)
$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$：$T$ の像.　(像 ··· image)



例

$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbb{x} \mapsto A\mathbb{x}$ (A は $m \times n$ 行列).
$\mathrm{Ker}(T_A) = \{\mathbb{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbb{x} = \mathbb{o}\}$：連立方程式の解空間；
$\mathrm{Im}(T_A) = \{A\mathbb{x} \mid \mathbb{x} \in \mathbb{R}^n\}$

定義 (核，像)

$T : V \to W$：線形写像.
$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$：$T$ の核；　(核 ··· kernel)
$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$：$T$ の像.　(像 ··· image)



例

$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbb{x} \mapsto A\mathbb{x}$ (A は $m \times n$ 行列).
$\mathrm{Ker}(T_A) = \{\mathbb{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbb{x} = \mathbb{o}\}$：連立方程式の解空間；
$\mathrm{Im}(T_A) = \{A\mathbb{x} \mid \mathbb{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{\mathbb{b} \in \mathbb{R}^m \mid A\mathbb{x} = \mathbb{b}\,(\mathbb{x} \in \mathbb{R}^n)\}$

定義 (核, 像)

$T : V \to W$: 線形写像.

$\mathrm{Ker}(T) := \{\mathbb{v} \in V \mid T(\mathbb{v}) = \mathbb{o}\}$: T の核 ; (核 ··· kernel)

$\mathrm{Im}(T) := \{T(\mathbb{v}) \mid \mathbb{v} \in V\}$: T の像. (像 ··· image)



例

$T = T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mathbb{x} \mapsto A\mathbb{x}$ (A は $m \times n$ 行列).

$\mathrm{Ker}(T_A) = \{\mathbb{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbb{x} = \mathbb{o}\}$: 連立方程式の解空間 ;

$\mathrm{Im}(T_A) = \{A\mathbb{x} \mid \mathbb{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{\mathbb{b} \in \mathbb{R}^m \mid A\mathbb{x} = \mathbb{b}\,(\mathbb{x} \in \mathbb{R}^n)\}$

$= \{\mathbb{b} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbb{b} \in C(A)\} = C(A)$.

定理 14

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明)

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい.

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい. ($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい．($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}.$$

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい. ($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}. \quad \therefore \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T).$$

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい．($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T)$.

$T(k\,\mathbb{v}_1) = k\,T(\mathbb{v}_1) = k\mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$.

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい. ($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T)$.

$T(k\,\mathbb{v}_1) = k\,T(\mathbb{v}_1) = k\mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$.

(b) $\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{w}_1 + \mathbb{w}_2, k\,\mathbb{w}_1 \in \mathrm{Im}(T)$ を示せばよい.

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい. ($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T)$.

$T(k\,\mathbb{v}_1) = k\,T(\mathbb{v}_1) = k\mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$.

(b) $\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{w}_1 + \mathbb{w}_2, k\,\mathbb{w}_1 \in \mathrm{Im}(T)$ を示せばよい.

$\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T) \Rightarrow \exists \mathbb{u}_1, \mathbb{u}_2 \in V$ s.t. $T(\mathbb{u}_1) = \mathbb{w}_1$, $T(\mathbb{u}_2) = \mathbb{w}_2$.

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい. ($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T)$.

$T(k\,\mathbb{v}_1) = k\,T(\mathbb{v}_1) = k\mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$.

(b) $\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{w}_1 + \mathbb{w}_2, k\,\mathbb{w}_1 \in \mathrm{Im}(T)$ を示せばよい.

$\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T) \Rightarrow \exists \mathbb{u}_1, \mathbb{u}_2 \in V$ s.t. $T(\mathbb{u}_1) = \mathbb{w}_1$, $T(\mathbb{u}_2) = \mathbb{w}_2$.

$\therefore \mathbb{w}_1 + \mathbb{w}_2 = T(\mathbb{u}_1) + T(\mathbb{u}_2) = T(\mathbb{u}_1 + \mathbb{u}_2) \in \mathrm{Im}(T)$,

定理 2

$T : V \to W$：線形写像.
(a) $\mathrm{Ker}(T) \subset V$：部分空間；
(b) $\mathrm{Im}(T) \subset W$：部分空間.



(証明) (a) $\mathbb{v}_1, \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2, k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$ を示せばよい. ($\because$ 4 章定理 4 より和とスカラー倍で閉じていればよい)

$T(\mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2) = T(\mathbb{v}_1) + T(\mathbb{v}_2) = \mathbb{o} + \mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore \mathbb{v}_1 + \mathbb{v}_2 \in \mathrm{Ker}(T)$.

$T(k\,\mathbb{v}_1) = k\,T(\mathbb{v}_1) = k\mathbb{o} = \mathbb{o}$. $\quad \therefore k\,\mathbb{v}_1 \in \mathrm{Ker}(T)$.

(b) $\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T), k \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{w}_1 + \mathbb{w}_2, k\,\mathbb{w}_1 \in \mathrm{Im}(T)$ を示せばよい.

$\mathbb{w}_1, \mathbb{w}_2 \in \mathrm{Im}(T) \Rightarrow \exists \mathbb{u}_1, \mathbb{u}_2 \in V$ s.t. $T(\mathbb{u}_1) = \mathbb{w}_1$, $T(\mathbb{u}_2) = \mathbb{w}_2$.

$\therefore \mathbb{w}_1 + \mathbb{w}_2 = T(\mathbb{u}_1) + T(\mathbb{u}_2) = T(\mathbb{u}_1 + \mathbb{u}_2) \in \mathrm{Im}(T)$,

$k\,\mathbb{w}_1 = k\,T(\mathbb{u}_1) = T(k\,\mathbb{u}_1) \in \mathrm{Im}(T)$. $\square$

注意

$T : V \to W$：線形写像，$\{\mathbb{v}_1, \ldots, \mathbb{v}_n\}$：$V$ の基底.
$V \ni \mathbb{v} = k_1\mathbb{v}_1 + \cdots + k_n\mathbb{v}_n \Rightarrow T(\mathbb{v}) = k_1T(\mathbb{v}_1) + \cdots + k_nT(\mathbb{v}_n)$.

注意

$T : V \to W$：線形写像，$\{\mathbb{v}_1, \ldots, \mathbb{v}_n\}$：$V$ の基底.

$V \ni \mathbb{v} = k_1\mathbb{v}_1 + \cdots + k_n\mathbb{v}_n \Rightarrow T(\mathbb{v}) = k_1T(\mathbb{v}_1) + \cdots + k_nT(\mathbb{v}_n)$.

$\mathbb{v}$ の行先 $T(\mathbb{v})$ は基底 $\mathbb{v}_1, \ldots, \mathbb{v}_n$ の行先 $T(\mathbb{v}_1), \ldots, T(\mathbb{v}_n)$ で決まる！