はじめに　(数学基礎 B1)

数学基礎 B　＝　**線形代数**

教科書「要点明解　線形数学　三訂版」培風館

(第１章　ベクトル)
- 第２章　行列
- **第３章　連立１次方程式**

(第４章　行列式)

(第５章　行列の対角化)

講義の情報　http://mathweb.sc.niigata-u.ac.jp/~hoshi/teaching-j.html

シラバス　LINK

- ノートを取りながら講義を聴くこと.
  (ノートを回収して確認する可能性があります)
- 講義 $\longrightarrow$ 小テスト (理解度確認テスト，学務情報システム内)

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明)

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき,

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換,

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に,

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる. この操作を $(1, n_1)$ 成分を中心として第 n_1 列を**掃き出す**という.

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる. この操作を $(1, n_1)$ 成分を中心として第 n_1 列を**掃き出す**という.
これを繰り返していけば, **ガウス行列**をえる. □

定理

全ての $m \times n$ 行列は (行) 基本変形を何回か行って**ガウス行列**にできる.

(証明) $A = \boldsymbol{O}$ (零行列) は**ガウス行列**. $A \neq \boldsymbol{O}$ のとき, A を第 1 列 (左) から順にみて最初の零ベクトルでない列を n_1 列とする. 基本変形 I で行を交換, II で (k 倍して) 一番上を 1 に, III で 1 の下をすべて 0 にできる. この操作を $(1, n_1)$ 成分を中心として第 n_1 列を**掃き出す**という.
これを繰り返していけば, **ガウス行列**をえる. □

- このようにして**ガウス行列**を求める方法を**掃き出し法**という.

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3)$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \ \boxed{\text{III}} \longrightarrow$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \ \boxed{\text{III}} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \quad \boxed{\text{III}} \longrightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5)$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \Big\downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \Big\downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \Big\downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \frac{1}{8}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \ \boxed{\text{III}} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \ \boxed{\text{III}} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\boxed{\text{III}} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \ \boxed{\text{II}} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を掃き出し法でガウス行列にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を**掃き出し法**で**ガウス行列**にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$ を掃き出し法でガウス行列にする.

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-3) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-5) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \downarrow \times(-2)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & \mathbf{0} & 8 & -8 \end{pmatrix} \times \tfrac{1}{8} \xrightarrow{\boxed{\text{II}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \uparrow \times 1 \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8)$$

$$\xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \downarrow \times(-8) \xrightarrow{\boxed{\text{III}}} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \end{pmatrix}$$ ··· ガウス行列

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して**ガウス行列**にしたときの**初１**の数 (階段の数) を A の**階数** (rank) といい，$\mathrm{rank}(A)$ とあらわす.

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して**ガウス行列**にしたときの**初１**の数 (階段の数) を A の**階数** (rank) といい，$\mathrm{rank}(A)$ とあらわす.

例

上の例より,

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して**ガウス行列**にしたときの**初１**の数 (階段の数) を A の**階数** (rank) といい，$\mathrm{rank}(A)$ とあらわす.

例

上の例より,

$$\mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 2.$$

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して**ガウス行列**にしたときの**初１**の数 (階段の数) を A の**階数** (rank) といい，$\mathrm{rank}(A)$ とあらわす.

例

上の例より,

$$\mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 2.$$

また，以前の例より

$$\mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 \end{pmatrix}\right) = 2.$$

定義 (階数)

行列 A を行基本変形して**ガウス行列**にしたときの**初１**の数 (階段の数) を A の**階数** (rank) といい，$\mathrm{rank}(A)$ とあらわす.

例

上の例より,

$$\mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 2.$$

また，以前の例より

$$\mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 \end{pmatrix}\right) = 2.$$

$$\mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{pmatrix}\right) = \mathrm{rank}\left(\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 \end{pmatrix}\right) = 3.$$

注意

行列 A の**階数** $\mathrm{rank}(A)$ は行基本変形では変化しない.

注意

行列 A の**階数** $\mathrm{rank}(A)$ は行基本変形では変化しない.

注意

A : $m \times n$ 行列 $\Rightarrow \mathrm{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$.
但し, $\min\{m, n\}$ は m と n の最小値 (minimum) をあらわす.

3.3　連立1次方程式

より一般には,

3.3　連立 1 次方程式

より一般には,

連立 1 次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる.

3.3　連立 1 次方程式

より一般には,

連立 1 次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる．(1) は，行列をもちいて

3.3　連立 1 次方程式

より一般には,

連立 1 次方程式
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる．(1) は，行列をもちいて

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $\mathbb{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbb{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ に対して,

3.3　連立 1 次方程式

より一般には,

連立 1 次方程式
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる．(1) は，行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\ \mathbb{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\ \mathbb{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$ に対して,

$$\boxed{A\mathbb{x} = \mathbb{b}}$$

と表せる.

3.3　連立 1 次方程式

より一般には,

連立 1 次方程式
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる．(1) は，行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\ \mathbb{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\ \mathbb{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$ に対して,

$$\boxed{A\mathbb{x} = \mathbb{b}}$$

と表せる．行列 A を連立 1 次方程式 (1) の**係数行列**,

3.3　連立 1 次方程式

より一般には,

連立 1 次方程式
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \cdots(1)$$

を解く必要がでてくる．(1) は，行列をもちいて

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\ \mathbb{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\ \mathbb{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$ に対して,

$$\boxed{A\mathbb{x} = \mathbb{b}}$$

と表せる．行列 A を連立 1 次方程式 (1) の**係数行列**，A の最後の列に $\mathbb{b}$ を付け加えた $m \times (n+1)$ 行列 $\overline{A} = (A \mid \mathbb{b})$ を**拡大係数行列**という．